

1. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi diğerlerine göre daha verimlidir?

- A) Terra - Rossa B) Podzol C) Laterit  
D) Tundra E) Çernozyom

2. Kimyasal çözülme, hangi iklim bölgelerinde diğerlerinden daha fazla görülür?


- A) Ekvatorial - Muson B) Tundra - Step  
C) Akdeniz - Step D) Karasal - Akdeniz  
E) Savan - Okyanus

3. Türkiye'de yamaç süpürülmesinin ve toprak aşınmasının fazla olmasında;

- I. Arazinin engebeli olması  
II. Yağışların daha çok yağmur olarak düşmesi  
III. Bitki örtüsünün seyrek olması  
IV. Toprak örtüsünün kalın olması

gibi faktörlerden hangileri daha çok etkilidir?

- A) I-II B) I-III C) III-IV D) I-IV E) II-IV



Yukarıda heyelanın oluşumu gösterilmiştir. Bu oluşum aşağıdaki bölümlerin hangisinde daha çok görülür?

- A) Doğu Karadeniz Bölümü  
B) Yukarı Kızılırmak Bölümü  
C) Batı Karadeniz Bölümü  
D) Antalya Bölümü  
E) Erzurum - Kars Bölümü

5. Yamaç eğiminin fazla olduğu yerlerde aşağıdaki-lerden hangisi görülmaz?

- A) Heyelan B) Yağmur erozyonu  
C) Boğaz vadileri D) Derine aşındırma  
E) Birikinti konisi

6. Aşağıda bazı dış kuvvetler ve bunların meydana getirdiği aşındırma şekilleri verilmiştir. Bu eşlemede hangisi yanlıştır?

- A) Akarsu → Dev kazanı  
B) Buzul → Lapyra  
C) Rüzgar → Mantarkaya  
D) Dalga → Falez  
E) Yeraltı suları → Obruk

7. Erzurum - Kars Platosunda humus bakımından zengin çernozyomlar (Kara Topraklar) bulunduğu halde bu bölgede tarımın fazla gelişmemesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yerskilllerinin engebeli olması  
B) Yükseltisinin fazla olması  
C) Toprağın fazla yıkanmış olması  
D) Yaz yağışlarının olması  
E) Bitki örtüsünün uzun boylu çayırardan oluşması

8. Taşların mekanik yolla çözülmesi;

- I. Ilıman Kuşak Karasal  
II. Sıcak Kuşak Muson  
III. Tropikal Kuşak Çöl  
IV. Ilıman Kuşak Okyanus

iklim bölgelerinden hangilerinde daha çok görülür?

- A) I-II B) II-III C) III-IV D) I-III E) II-IV

9. Yandaki şekilde, ülkemizde meydana gelen heyelanların mevsimlere göre dağılımı verilmiştir. Buna göre heyelanların ilkbahar mevsiminde yoğunluk kazanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yer kabuğunun yapısı B) Yer hareketleri  
C) Sıcaklık farkları D) Bitki örtüsü  
E) Kar ve buz erimeleri

